幼幼新書

幼幼新書卷第二十一　寒痛逆羸　凡十六門

後學古吳陳履端干始輯

延陵吳安治順甫校

胎寒第一

巢氏兒在胎母取冷過度冷氣入胞傷兒腸胃兒生後冷氣猶在腸胃間不能消乳哺或腹脹或時榖利令顏色青肥時啼為胎寒痛

千金翼兒胎寒當腹痛痛者躽啼時時吐哯或腹中如雞子黃者按之如水聲便沒沒已復出無所苦早

服當歸丸〔驅啼門〕黃耆散〔闕〕

茅先生兒生一日口舌冷腹虛鳴面臉青喫乳有妨因在胎六個月日母有疾被伏熱往來胎中飲熱血所得先以朱砂膏〔驚積門〕妳上吮後磨鎮心丸〔一切驚門〕如都不進妳及肚膨手握拳目微視面黑死〔此以熱論故並存之〕

胎寒歌

人中皐下有青色乳見難消痢色同衣薄中寒

如是此風邪夾冷上來攻

聖惠當歸散治胎寒聚啼夭舌軀啼反張怒驚

當歸炒　細辛　黃耆　黃芩

龍骨　桂心　赤芍藥各半兩

羅散乳汁調一字日三意加減

嬰孺當歸丸大便青不能食是胎寒

當歸　人參　芍藥　芎各三分

甘草四分

末乳汁和先食服麻子大一丸日三未知加

治兒胎寒大人虛冷內或有實不可吐下虛冷服礬

石丸

馬齒礬石燒汁盡爲末棗膏丸大人服梧子大二丸兒減心腹中温煖爲度有實實去無實下自斷

黄耆湯治胎寒腹中㽲痛

黄耆　黄芩　芍藥各六分　當歸二分

甘草　芎各四分　薑八分

吹咀水五升煮升半百日兒半合予三服

虛寒第二

錢乙論腎虛若兒本虛怯由胎氣不成則神不足目睛多白顱解面晄白色此皆難養縱長不過八八若

恣色慾多不及四旬或因疾而致腎虛者不論又腎氣不足則下竄蓋骨重惟欲墜于下而縮身也腎水陰也腎虛則畏明宜補腎地黃丸

張渙兒脾胃虛弱不能飲食或經大病漸損榮衛致肌體羸瘦時時下痢面色青白變成虛羸宜丁香黃耆散

錢乙地黃丸

熟地黃八錢　山茱萸　乾山藥各四錢　澤瀉

牡丹皮　白茯苓各三分

末蜜丸如桐子三歲二三丸空心湯化下

張渙丁香黄蓍散

綿黄蓍　丁香　人參　當歸

白术炮　鼈甲醋炙各一兩　胡黄連　甘草炙各半兩

末一錢水一盞薑二片棗二枚煎五分食前溫服

患眼治吐瀉及傷寒脾虚腹熱或手足冷虚汗不已

喉内虚喘附子散一名回陽散

附子炮　北前胡　甘草　人參

桔梗各半兩　麻黄去節一兩

末淡薑湯調半錢至一錢量加此能補虛

寶童治腹内虛鳴烏藥丸

天台烏藥　蒼朮炒各二两　木香　甘草各一分

肉豆蔻二枚

末醋糊丸如黍服七至十丸炒薑葱酒下

吉氏兒面青黄手足逆冷不思食飲和氣散

厚朴薑製半两　人參　茯苓　甘草炮各一分

茴香二錢

末加减水煎

胷中有寒第三

巢氏三焦不調則寒氣獨留膈上令兒乳哺不消下嗌酸臭胷膈痞滿甚則喘急

聖惠治膈寒或嗽逆不食訶梨勒散

訶梨勒煨皮一兩　白术　五味子　麥門冬焙

人參　白茯苓　陳皮去白焙　甘草炙各半兩

細辛一分

麤羅一錢水一盞煎五分不時量溫服

人參散治胷中有寒多吐清水不乳

人參 厚朴薑汁炙 陳皮去白焙 白朮各半兩

當歸炒 丁香各一分

羅散一錢水二盞薑少許煎五分不時意增減服

肉豆蔻散 胃中有寒乳哺不消腹中痞滿氣逆不能乳食

肉豆蔻 人參 藿香 白茯苓

白朮 甘草炙 木香各一分 厚朴薑炙

訶黎勒皮煨 乾薑炮各半兩

粗散一錢水小盞煎五分溫量服日三

草豆蔻散治胷中寒氣積滯氣逆不下乳食

草豆蔻仁三枚 人參 前胡 檳榔各一分

訶黎勒皮煨半兩 甘草炙半分

粗羅一錢水小盞煎五分不時溫量服

前胡散治胷中寒結時欲嘔吐

前胡 人參 白朮 陳皮去白焙

高良薑 厚朴薑炙 藿香各一分 甘草炙半分

粗羅一錢水小盞煎五分不時量溫服

胷脇滿痛第四

巢氏兒失節度為寒熱所傷寒氣入腹乘虛停積又乳哺冷熱不調觸于宿寒與氣相擊不散結胷脇間故滿痛

真珠橐木香散治兒氣痛因生冷傷而成只在臍上下左右痛宜順氣寛中此治胷膈痞塞心腹刺痛脅脹滿飲食少噫氣吞酸嘔逆噎悶一切氣疾

木香　青橘皮各三兩　薑黄　麥蘖炒各五兩

蓬莪茂四兩　甘草炒　塩炒各十一兩

末一錢不時沸湯點服

外臺灸勞宮二壯一名五里在掌中動脉主熱病發熱滿而欲嘔噦三日以往不得汗怵惕胷脅痛不可反側欬滿溺赤大便血衄不止嘔吐血氣逆噫不止嗌中痛食不下善渴口中爛掌中熱風熱善怒中心善悲累嘔歔欷善笑不休煩心欬寒熱善噦少腹積聚兒口中腥臭胷脅肢滿黄疸黄目

心痛第五

聖惠心痛本非起于心即邪氣客于心主之脉夫少陰心經五藏六府之主精神所舍其藏堅固邪不能

千千之傷心心傷即神去神去即死故諸邪在心者皆在心包絡包絡心之别脉也故少陰不病夫心痛者厥氣上逆痞而不散或傷寒氣邪冷搏于經絡故

心痛

茅先生心頭痛者金鈴散夾匀氣散（胃氣不和門）如面黑眼視瀉黑血鼻口冷手足冷不進食死

寶鑑兒悒心啼有時歇者名心痛是邪攻胃管

肘後治卒心痛腹脹堅如石滿氣喘息

好塩如雞子大漿水三升煮三沸內攪消取半分

為三服

聖惠兒數將手摩心腹即啼是心痛不可忍芍藥散

赤芍藥　人參　白术　黄芩

川大黄炒　當歸各一分

粗散一錢水小盞煎五分不時温量服

木香散治心痛手足不和

木香　白术　桔梗　茯苓赤各一分

高良薑炒

粗散一錢水小盞煎五分稍熱量兒頻服

桂心散

桂心　當歸　梔子仁各半分

細羅不時橘皮湯調半錢更量加

茅先生金鈴散

金鈴子炮去皮核　蓬莪茂炮各一兩　茴香　木香炮

京三稜炮各半兩

末一錢半錢熱酒調下

張氏治脾疼久腫心氣痛患

木香皁子大兩塊　丁香三七粒　乳香半皁子大　胡椒四十九粒

巴豆　斑猫淨各二七粒　五靈脂一塊中指大

細末醋糊丸如芥子服三丸菖蒲湯下婦人艾醋湯兒兩三丸如衮顫氣攻痛難忍者一服效

王氏普救散

延胡索二兩　香附子一兩

細末一錢白湯點服

腹痛第六

巢氏兒腹痛多由冷熱氣與藏氣相擊故痛熱痛者面赤或壯熱四肢煩手足心熱冷痛者面或青或白

甚者黑唇口爪皆青

茅先生兒中熱痛詩

非時面赤色壯熱四肢煩手足心多熱心中熱

痛難

冷痛詩

面青面白猶自可黑色同青爪一同此是腹心

生冷痛須將溫藥裹頭攻

寶鑑腹堅歌

娠娠先須忌數般莫令風冷致胎寒兒生啾唓

翻嬔乳肚痛頻生腹亦堅

肘後治未百日腹痛徐王神效方

豚子卵一枚　當歸一分

水三升煮七合飲

聖惠當歸散治冷熱不調腹內多痛

當歸　枳殼麩炒　赤芍藥　川大黃炒

等分粗羅一錢水小盞煎五分溫量服

人參散治卒吐下腹痛不止

人參　當歸炒各半兩　甘草炙　乾薑炮裂

黄蓍　細辛各一分

粗羅一錢水小盞煎五分稍熱量兒頻服

又方

木香　高良薑　白术　人參各一分

厚朴半兩薑炙

細羅不時粥飲調半錢量加

嬰孺治腹痛夭糾不能哺乳茯苓丸

茯苓　黄連各一兩

末蜜丸如大豆飲下量與

錢乙和胃氣止吐瀉定煩渴治腹痛思食和中散

人參焙去頂　白茯苓　白术　甘草炒

乾葛　黄耆　白(扁)[稨]豆　藿香

等分細末三錢水一盞棗二個薑五片煎八分食前温服

張涣寬中湯治心腹痛不可忍

高良薑　木香各半兩　丁香　青橘皮炒

桔梗　甘草炙各一分

細末半錢温酒調服

温胃丹治腹痛啼哭不止

人參　白术炮各一两　五味子　當歸焙

高良薑各半两　木香一两

細末白麵糊丸如黍米飲下十丸

橘香散

青橘皮　吳茱萸　木香　當歸焙各一两

乾薑炮　丁香各半两

羅末一錢水八分薑二片前五分食煎温熱服

恵眼治氣疾腹痛及消積滞槐角丸

槐角一錢蜜炙抄 胡椒四十九粒 巴豆二粒 丁香卄粒

細末爛飯丸如黍空心薑湯下五丸

莊氏兒未能語啼哭不能辨者以手候腹如有實硬處即是腹痛

生薑汁煖調麪糊塗貼臍心

吉氏治脾疼脅脹和氣止渴及腹內刺痛不思飲食

香朴散

厚朴一兩薑炙 麥糵 神麴 青皮並炒

木香各一分

末一錢湯調服

腹脹第七 附腹滿

巢氏兒府藏嫩弱風冷邪氣客搏于藏令腹脹若脾虛冷移入于胃食則不消若腸虛冷氣乘之則利

錢乙腹脹由脾胃虛氣攻作也實者悶亂滿喘可下主紫霜丸（積聚門）白餅子（搐搦門）不喘者虛也誤下則脾虛氣附肺行脾肺子母皆虛肺主目胞顋之類脾主四肢母氣虛甚即目胞顋腫色黃者屬脾治用塌氣丸漸消之（胃氣不和門）末愈加服勿以丁香木香橘皮豆

蔻大温散藥治何以故脾虚氣不出腹脹而不喘宜
散藥使上下分消其氣若虚氣已出附肺即脾胃內
弱每生虚氣入四肢面目矣兒易為虚實脾虚不受
寒温服寒則生冷服温則生熱須識之胃久虚熱多
生疸病或引飲不止脾虚不能勝腎隨肺氣行于四
肢若水狀腎氣浸浮于肺即大喘服塌氣丸病愈後
面未紅者虚衰不復故也治腹脹者譬若戰寇于林
寇未出林攻以兵必獲若出林勿急攻攻必有失意
漸收之即順治虚腹脹塌氣丸不愈腹有食積結糞

小便黄時微喘脉伏而實時飲水不能食者可下葢

脾初虚而後結有積治先補脾後下下後又補脾愈

補肺恐生虚喘

肘後兒腹暴病滿欲死

半夏篩酒和服黍米五丸日三

千金米粉塩等分妙變色腹上摩

外臺療肚脹漸瘦不食四肢熱不調

甘草炙　鼈甲炙　柴胡　茯神

子芩各六兩　訶梨勒皮十分　檳榔三顆　芍藥

橘皮各三分　薑　當歸各四分　知母五分

大黄八分

切水升半煎七合數服得瀉差

秘錄治腹脹

胡粉塩熬色變摩腹上兼治腹皮青若不理須臾死

喫雜生果多腹脹氣急

肉桂末飯丸如菉豆湯下五丸大人十丸

聖惠治脾胃虛冷腹脅脹滿四肢不和乳食全少丁

香散

丁香　桂心　白朮　人參各一分

厚朴薑炙　陳橘皮去白焙各半兩

粗羅一錢水小盞薑少許棗一枚煎五分溫服日三四

木香散治腹虛脹

木香　川大黃　麝各一分　桑白皮

陳橘皮焙去白　益智仁　草豆蔻仁各半兩

粗羅一錢水小盞薑少許煎五分不時量服

赤茯苓散治腹壅脹滿虛熱不食大小腸氣滯

赤茯苓　木通　人參　甘草炙

枳實麸炒　當歸炒各一分　川大黃炒半兩

羅散一錢水小盞煎五分不時溫量服

治氣不和心腹脹滿不食檳榔散

檳榔　厚朴薑炙各半兩　丁香一分

羅散一錢水小盞煎五分不時溫量服

張渙木沉散

木香　益智仁　沉香各一兩　蓬莪茂

草豆蔻麫裹煨　白豆蔻各半兩

羅末一錢水八分薑三片煎五分溫服

衛生驅氣丸療腹脹氣急

蘿蔔子半兩巴豆肉破同炒黑　木香一分

細末蒸餅心丸如菉豆橘皮湯下五丸

張氏紫霜丸治食傷或病妳至冷腹脹

薑切　巴豆

好醋一碗煮乾用巴豆

雄黃　朱砂各半錢

細末蒸餅糊丸如粟兒食傷三粒腹脹喘急分減

食湯下無時

吉氏塌氣散治疳虛腹脹

甘草　茴香　白牽牛並炒　木香各一錢

末半錢紫蘇湯服

丁時發溫脾散治脾胃不和腹脅虛脹不欲乳食精

神困倦或壯熱增寒

人參　訶梨勒各三分　白朮　木香

黃耆　茯苓　藿香　陳皮

桔梗各半兩 甘草炙分 一 沒石子一個

末一錢水一盞薑一片棗一個煎五分服

木香丹治諸般傷冷冷物作熱及腹脹黃瘦

木香二錢 川烏頭炮裂三個 皂角去皮七個 縮砂

巴豆霜各二七枚

細末烏梅二七個蒸爛入藥丸如菉豆服三五粒

蘿蔔子薑湯下

鄭愈治腹脹并水鼓氣病

雞子白一個 白麪一匙 輕粉一錢

和作餅小錢大服一餅慢火内燒熟紙筋上去火
毒細嚼臨臥服
外臺灸懸鍾足三陽大絡在外踝上三寸動脉中按
之陽明脉絶乃取之灸五壯主腸滿胃中有熱不食
兒腹滿不食飲
冷熱不調第八
聖惠兒乳食乖度寒温失節或陰陽相勝氣血不調
令冷歸下焦熱充上膈若風冷入腸胃則瀉利不定
或腹中氣滿或嘔逆不食為冷熱不調

張渙兒不能自調攝全在乳母若乳哺乘宜則冷熱不調熱衝上膈冷歸下焦致虛實不等水穀不消遂傷脾胃胃虛則嘔吐脾虛則泄利挾積則下痢脾胃最宜調適若疾證甚不已令虫動生風便致危困可不慎哉

聖惠木香散治冷熱不調胃氣壅滯少思飲食

木香　大腹皮　人參　赤茯苓

青橘皮去白焙　訶梨勒皮　桂心　前胡

半夏洗七次　丁香　甘草炙各一分

粗散一錢水一盞薑半棗大煎五分量溫服

白术散治冷熱不調腹內疼發歇不定

白术　當歸炒　芎藭各半兩　乾薑

青橘去白焙　甘草炙各一分

粗羅一錢水小盞煎五分不時量服

香連散治冷熱不調腹痛下利

木香　當歸炒　乾薑炮各一分　黃連

阿膠炒各半兩

細羅粥飲調半錢量頻服

治冷熱不調大便或壅或通不知乳食訶梨勒散

訶梨勒皮　大黄炒各半兩　人參　檳榔

木香　桂心　芎藭各一分

粗羅一錢水小盞薑少許煎五分不時量溫服

當歸丸治冷熱不調大便青黃心腹多痛不欲乳食

當歸炒　人參　白芍藥　芎藭各三分

甘草炙　白术各半兩

羅末麵糊丸如麻子粥飲下五丸日三三歲上加

治冷熱不調腹痛不可忍或寒熱下痢膿血木香散

木香一分　芎藭　當歸炒　桔梗

黃芩各半兩

末蜜丸如桐子不時温薑湯破二丸服量加

治冷熱不調或下痢腹痛不食犀角散

犀角　桂心　甘草炙　當歸炒

黃連　人參　陳皮去白焙

粗羅一錢水小盞煎五分量温服日三

張涣調中散治冷熱不調致脾胃不和

青橘皮去白焙　人參　木香各一兩　白茯苓

丁香　白术　大腹皮　甘草炙各半兩

細末一錢水小盞薑三片煎五分溫服

益胃丹調冷熱和脾胃

當歸焙　木香　白术炮　沉香炮各一兩

白芍藥　蓬莪茂　縮砂仁　人參各半兩

細末麪糊丸如黍服十粒至十五粒點麝湯下更量加

三稜丹調冷熱消宿食

京三稜炮乘熱破　神麴　木香　半夏薑擣膏炒

黃各一兩 乾薑炮 陳橘皮去白 丁香

桂心各半兩

細末蜜丸如雞頭服一粒薑湯化

趙氏治冷熱不調瀉痢不止腹中疼痛三聖丸

黃連 乾薑炮 甘草炙

等分末麪糊丸菉豆大服七丸赤痢甘草湯白痢

乾薑湯赤白痢二宜湯下

人參丸調氣治冷熱不調飲食不化

人參 木香 白术 蓬莪茂

當歸炒各半兩 白芍藥一分

末湯浸蒸餅丸如黍服十丸空心麝湯下米飲亦

得

胃氣不和第九 附脾胃

張渙兒飲乳不知飢飽全在乳母存節若見啼哭即

乳是氣未調使急飲氣逆乳不得下反致嘔逆甚則

吐利成胃虛病

錢乙胃氣不和面晄白無精光口氣冷不思食吐水

當補脾又腹痛不思食又氣不和口頻撮當調氣並

主益黃散若下利調中丸

聖惠人參粥治冷傷脾胃嘔逆及利驚癇

人參半兩　白茯苓三分　粟米半合　麥門冬一兩

細剉半兩水一大盞煎七分下米作粥食

博濟木香散調中順氣補虛

草豆蔻五個　人參　茯苓　防風

藿香各半兩　陳橘皮去白一分

末一字或半錢薑鹽米飲調

茅先生匀氣散

桔梗五两　甘草炙二两　白薑一分　縮砂仁

陳橘皮　茴香洗各一两

末半錢或一錢霜木瓜煎湯調服紫蘇鹽湯亦得寶畫多厚朴蒼朮良薑桂烏梅名養脾湯

調理脾病醒脾散

木香　白朮並濕紙裹煨　人參　茯苓

草菓子　甘草炙　陳橘皮　厚朴細砂水煑

紫蘇子

等分末一錢水六分薑一片棗半個煎四分通口

服

治諸疾調中飲

肉豆蔻 白朮炮 人參 陳橘皮去白

訶子炮 茴香 縮砂仁 甘草炙各半兩

藿香 桂心 檳榔各三錢

末半錢一錢薑棗湯隨兒通口服

錢乙調中丸

白朮 人參去頂 甘草炙各半兩 乾薑炮四錢

細末蜜丸如菉豆服半丸至二三十丸食前湯服

塌氣丸

胡椒一兩　蝎尾去毒半兩

細末麪糊丸粟大服五七至二十丸陳米飲下無時一有木香一錢劉氏亦治腹脹

益黃散

陳橘皮一兩　青橘皮　訶子肉　甘草炒各半兩

丁香二錢

細末二錢水一盞煎六分食前温服

白朮散

人參　白术　木香　白茯苓
甘草炒　藿香各一兩　乾葛二兩
粗末一二錢水一盞煎五分溫服飲水者多與之
惠眼參苓散常服養氣安神益胃
白术半兩　人參　茯苓　紫蘇子
甘草炙各一分　木香半分
細末一錢濃煎棗湯調宜常服
寶童壯脾去積進食
京三稜　蓬莪茂醋紙裹煨　益智去皮各四兩　甘草炙四兩半

陳皮　青皮各二两

末湯點一錢不時服薑棗煎亦得

劉氏人參散調胃進食

人參　白朮　川芎　神麯

木香　陳皮　肉桂去粗皮　甘草炙等分

小麥糵加一倍

末半錢塩少許百沸湯點服

治恙後脾胃虛弱煩熱恍惚驚中多驚氣急煩亂溫養脾胃消進飲食勻氣清神調和藏府神朮散

白术　人參　茯苓　石蓮肉去心

罌粟米　白扁豆　藿香　甘草炙

等分細末半小錢棗湯調空心日午服漢東觀音散少白术

粟米多神麯白芷木香黄蓍

張氏治脾胃不和泄瀉下痢傷冷面色痿黄心痛藏

府不安癥癖氣塊脾胃皆治丁香煮散

丁香一兩　神麯濕紙裹爐　呵子大棗者　乾薑生熟各半

半夏火炮　厚朴薑製　甘草生熟各半各三兩

陳橘皮四兩半

羅末如麪薑三片藥二錢水一盞煎五分食前熱服甚者兩服日二忌生冷動氣物

莊氏治胃虛去風醒脾

冬瓜子廿一粒　天南星一錢

末蒸餅丸菉豆大五七至十丸温漿水下

補虛和氣散

人參　乾葛　甘草炮各五兩　木香三兩

麝一錢　茯苓二兩

末半錢水五分薑少許煎三分温服

丁香丸和胃氣進飲食

丁香　木香　肉豆蔻　人参

茯苓各一分　藿香半分

羅末朱砂二錢香墨一錢棗三個同研麵糊丸如

粟米飲下隨孩服

乳食不下第十

聖惠論脾臟也胃府也脾胃二氣合為表裏胃受穀

而脾磨之二氣平調則穀化而能食若虛實不等水

穀不消令腹脹或泄利不食脾胃不和

千金地黄丸治胃氣不調不嗜食生肌肉

乾地黄　大黄各兩六銖　茯苓十八銖　杏仁

柴胡　當歸各半兩

末蜜丸如麻子服五丸日三

聖惠治脾胃不和見食欲嘔心胷壅悶前胡散

前胡　蘆根各三分　桂心一分　人參

白术　赤茯苓　枇杷葉去毛炙　甘草炙

厚朴薑炙各半兩

粗羅一錢水小盞薑少許煎五分不時量温服

高良薑散治冷傷脾胃氣不和心腹痛不食

高良薑 草豆蔻 當歸炒 陳橘皮焙

桂心各一分 人參半兩

羅散一錢水小盞煎五分不時溫量服

嬰孺治三七歲兒不食或嘔或頭熱或下利或渴或手脚熱有時冷每日一劑便能食

鼈甲一兩 當歸 甘草炙 升麻各一分

桃五十粒汗

切水一升煮八合為三服相去人行六七里再服

覺身上潤衣蓋取汗微汗勿深

張渙集香煎治脾胃虚不欲食羸瘦

藿香　厚朴薑製　丁香　沉香

木香各一分　白茯苓　白豆蔻　白术炮各半兩

細末入麝一錢水一升蜜半斤大棗卅枚薑廿片

銀石器中慢火熬膏去薑棗通風處陰乾每早子

大乳前米飲下

膈氣第十一

水鑑枇花散治膈氣

桃花二錢　半夏大錢　厚朴　桂各一分
乾薑　牙硝各二分　當門子　江豆各一個
擣散空心湯調一錢服至逡巡轉自食乳母忌酒
肉熱麪等
寶童治膈氣噎悶兩脇刺痛吐逆酸水氣塊往來疼
痛煩躁
檳榔　木通　甘草炙　栢葉炙黃
半夏
等分末二大錢水一盞煎六分入膩粉少許在乾盞

肉研勻通口服如結腸翻胃用虛寒門烏藥丸後用此兒半之

氣逆第十二 附哽氣

寶鑑兒氣逆者為乳母煩惱憂悶乳氣凝滯胷中灌擊其乳飲之成疾面黃白乳哺減少夜啼及哯但無精彩勿取轉轉之則劉

聚寶透關丸治哽氣行心經

續隨子半兩 大黃三錢 長檳榔一枚 木通半兩

甘遂 大戟各一錢 膩粉一錢七

除膩粉諸藥同擣羅去續隨子皮重男女小便拌勻（謂陰陽酒）入粉如硬糊日曬稍乾木蜜丸菉豆大燈心竹葉湯下廿丸小便色異為效五歲下七丸更加減湯使

王氏理一切氣木香分氣丸

青橘皮（一兩） 牽牛（炒二兩） 木香（一分）

細末糊丸菉豆大薑湯下五七丸

吉氏真珠散治硬氣

真珠 生犀（各半兩） 龍腦（一字） 香附（四錢）

細末半錢人參湯下

鄭愈取轉後宜調氣桂枝散

赤芍藥　桂心　藿香　白术各二錢

末半錢飯飲調下

千金灸心俞二七壯兒減治不能食胃中滿膈上逆氣悶熱

肌膚羸瘦第十二

巢氏兒羸瘦不生肌膚皆脾胃不和不能飲食故氣血衰弱不榮肌膚兒在胎遇寒冷或生挾伏熱皆不

能飲食故羸瘦挾熱者溫壯身熱肌肉微黃挾冷者
即時時下利唇口青皅
外臺小品療兒因食及在胎宿熱并乳母飲食粗惡
苦辛乳汁不起兒哺不為肌膚心腹痞滿萎黃瘦脊
四肢痿躄繚戾服之充悅
芍藥炙十分　黃耆　鼈甲炙　人參各四分
柴胡八分　茯苓六分　甘草炙　乾薑各二分如熱枳實代
擣篩蜜丸如大豆服五丸日二千金有大黃無黃

著一歲上乳服三丸更量

聖惠治𦡆瘦脾胃氣弱挾宿食不乳四肢不和呵梨勒散

訶梨勒皮　陳橘皮去白焙各半兩　黃耆

人參　白朮　藿香　桂心

白茯苓各一分　甘草炙半分

粗羅一錢水小盞薑少許棗一枚煎五分溫服日三四更量

黃耆丸治𦡆瘦體熱面黃不乳

黄蓍　赤芍藥　人參　甘草炙

胡黄連各半两　麥門冬焙　鼈甲醋炙各一两　柴胡三分

羅末蜜丸如麻子不時粥飲下五丸量兒

秦艽丸治羸瘦體熱心神煩悶小便赤黄

秦艽　桑根皮　枳殼麩炒　地骨皮

黄蓍　人參　赤茯苓　甘草炙

犀角各半两　龍腦一分　柴胡三分

末蜜丸菉豆大不時粥飲下五丸更增減

麥門冬丸治食不着肌膚骨熱小便黄赤

麥門冬焙一兩　人參　黃耆　青蒿子
桑白皮　枳殼麸炒　地骨皮　黃連各半兩
柴胡三分
末蜜丸如菉荳不時湯研五丸更加減
五香煎治脾胃久虛喫食減少四肢羸瘦
丁香　沉香　木香　藿香
白朮各一兩　麝三錢　白茯苓　陳皮去白焙
黃耆各一兩　訶梨勒皮　甘草各半兩炙
篩散水五升慢火煎一升布絞復入鍋煎麝及蜜

三合薑汁半合棗肉廿枚慢熬粥飲調半茶匙更

加減

嬰孺治羸瘦食少不生肌肉下隻烏雞骨丸

宿黃雌雞胸骨一具酒浸一宿炙黃　甘草　小草各炙三分

蜣蜋五個炙　桔梗　白朮　茯苓

芍藥各四分　人參　黃芩各五分　檳榔六分

末蜜丸小豆大二三歲兒服十五丸日二

張氏豬肚丸解肌熱或泄瀉及積滯不思飲食肌肉

消瘦

鼈甲一兩童便醋共一升熱浸炙盡爲度　白朮　薯蕷各一兩

胡黄連　人參　青橘皮　紫菀

桃仁　木香　甘草炙各半兩　柴胡一兩一分

羅末入淨猪肚内繫定煮爛與藥杵黏丸如梧子

服二三十丸不時湯飲下

張氏香甲丸治男婦童子氣血虛踈肌膚消瘦百節

痠潮作温五心煩熱四肢逆冷不思飲食中滿氣滯

婦人經血凝澀健脾胃暢神氣充肌膚澤顏色

柴胡　生地黄　京三稜各三分　鼈甲醋炙

神麯炒　杏仁　熟地黄　麥蘖炒各一兩

牛膝　木香　薑黄　當歸各半兩

白朮　芎各一分

細末麪糊丸如桐子服十丸空心清茶下米飲亦得

聖惠灸胃俞穴各一壯在第十二椎下两傍各寸半

陷者中炷如麥治羸瘦食少不生肌膚寶鑑三壯

病後虛羸第十四

巢氏兒大病後或驚癇或傷寒或溫壯而服藥或吐

利發汗差後血氣尚虛脾胃猶弱不能傳化穀氣以
榮身體故氣力虛羸
錢乙病後虛羸有冷者時時下利唇口青白有熱者
温壯身熱肌肉微黃此冷熱虛羸也冷者木香丸夏
月勿服熱者胡黃連丸冬月勿服有是證服之宜少
論用藥識證云齊郎中妏好藥施人子忽蔵熱自取
青金膏三服併一服餌之至三更瀉五行子睡齊言
子睡亦多驚又與一服瀉二行加口乾身熱齊言尚
有微熱又服妻曰用藥十餘行未安莫生病否呂錢

視云已成虛羸先多煎白术散時時服胃氣不和門後用
香瓜丸盜汗門十三日愈
外臺五味子湯療傷寒久病不除差後劇羸瘦骨立
五味子十銖　大黃六銖　麥門冬六分　芒硝五分
石膏一兩　甘草炙　當歸　黃芩
黃連　前胡各一分
切水三升煮升半服二合利下即止更量
錢乙木香丸
木香　青黛　檳榔　豆蔻各一分

麝錢半　續隨子去皮一兩　蝦蟇燒三個

末蜜丸菉豆大服三五丸至二十丸食前溥苛湯

下

胡黃連丸

胡黃連　黃連各半兩　朱砂一分

細末塡猪膽内淡漿水煮線釣勿着鍋一炊久取

出研入蘆薈麝各一分飯丸如麻子服五七丸至

三十丸食後米飲下

病後聲不出第十五

錢乙病吐瀉及大病後雖有聲而不能言又能嚥藥此非失音為腎怯不能上接陽故也當補腎地黄丸

歷寒門 失音乃卒病耳

吉氏

酸棗仁一錢 白茯苓半錢 朱砂二錢

末蜜丸如梧子脹一丸人參湯下

病後不能語第十六

聖惠治病後六七歲不能語雞頭丸

雞頭一枚燒灰 鳴蟬三枚炒 甘草炙 遠志

木通各半兩　麥門冬焙　人參各一兩　當歸

黃蓍　芩各三分　川大黃微煨一兩半

羅末蜜丸如菉豆粥飲下五丸量加減不時錢乙

云久服效

幼幼新書卷第二十一　萬卷樓刊

幼幼新書卷第二十二　積聚癥瘕　凡十門

後學古吳陳履端于始輯
㶚溪周應實汝賢校

積聚第一

茅先生兒吐奶酸臭氣爲奶積因吐未住而乳之致不消化日久停滯胃冷而得丁香散吐利門調胃後下實積牛黄丸實熱門取下奶積匀氣散補常服建脾散並胃氣不和門

夜間肚微熱或嘔或瀉爲食積此因飲食傷飽即臟

致之下補同前常服萬靈丸

面黃白不進食肚微痛夭矯啼叫為氣積因患諸般氣久而不安傳歸氣積所致宜萬靈丸勻氣散醒脾散脾氣不和慢脾風門夾建脾散調理

面黃如土色或帶虛臍上微痛肚皮熱飲食少纔食臍上及肚中便痛食不化頸微熱為脾積因食硬物或冷物傷脾青金丹取脾積後勻氣散醒脾散補常服建脾散萬靈丸

渾身微熱不思飲食渴日多昏昧抱着似睡未覺為

虛中積因久泄瀉不止而得青金丹通畫積後匀氣醒脾散調理常服萬靈丸保童丸一切疳門大便不通風毒瘡癤喉閉下題喉中涎響為實積因兒飢猛飲食無度致之奪命散急慢驚門吐熱涎後匀氣醒脾散調理常服牛黃膏膈熱門鎮心丸一切驚門天竺黃散實熱門

諸積各說不明藥亦等降然調理不退如面黑久瀉不止腹脹手心生瘡氣出粗瀉黑瘦弱不能坐立眼視皐口燥黑死

灊東王先生積可醫者九

面虛腫是積積者脾之所係脾主肌肉故應面脾係土土無正形故早晚浮腫不定多則早浮曉則脾不磨食面作腫病後有此是虛中積宜調脾消積行氣

面合地卧是積以冷積在脾也合地卧者脾好土也冷屬陰故知傷冷硬食得之宜下熱積氣藥

腹脹是積積在肺也肺主氣纔受積氣便冷腹脹滿氣急故知在肺先調氣後轉轉後更調氣

小便如油是積積在小腸也脾積當傳心心不受觸

則入小腸小腸心之府在小腸則節其水道小便如米泔油相似

髮黃是積積傷心也心主血脉蔭遍身毛髮被積所干則髮黃故知積傷心宜空心散訣及取積藥此兄時復發熱

赤白痢是積積在肺也肺受傳大腸及外傷冷而得蓋肺主西方庚辛金而大腸為府色白後赤是肺外邪傳大腸為赤白痢宜取後調氣

兩眼黃赤睛青是積積在肝也肝主東方甲乙木色

青被積氣所干眼屬肝肝受脾積氣所干則眼黃赤睛青若傳膽口苦不喫物宜涼藥退之

遍身虛腫是積積不在藏只在府也被藥發動積氣不在藏出皮膚間為腫宜取虛中積藥後補

多瀉白糞是積冷積在脾也脾主化冷積在脾冷滑而瀉白糞先轉後熱藥補

積不可醫者六

喘急是肺積肺主氣喘急則肺絕當面白全無血色不治

面黑是腎積面黑者腎絶也不辯人好惡眼直無光只一日死

吐熱氣是榮積血絶不可治也血主心心不能管故出熱氣不止

手脚心生瘡是衛積衛氣也胃氣不生故手足生瘡若衛絶則氣不回半日死

惡心吐乾嘔是胃積胃主化食胃絶則食乳不化不食乾吐嘔面青黃無血色

瀉久住又瀉是積積咬脾爛也瀉白糞爲食不消住

却放糞赤黑死知脾爛不治

寶鑑兒五積爲藏氣不行蓄積一處而不動也心積爲伏梁在臍上上攻心下攻胃脾積爲痞橫胃口上肝積肥氣在臍左肺積息賁在臍右腎積賁屯在臍下各有變動非食所成乃氣積也藏屬隂故在一處而不動

脹氣留聚也在六府府屬陽陽氣運轉不停故不定發則腹痛面黄瘦劣嗞啀不生肌肉髮立或肌體浮腫腹急多困多爲水氣

真珠囊虛中積候因驚取後復驚為驚中虛積下糞青纖因傷食瀉吐漸虛病未差為虛中積有積頻取轉不着致積尚伏亦曰虛中積驚積取下糞隨驚青食積糞成塊若癖中虛積者因癖病轉瀉虛而癖不退故也其糞褁白色

形證論八種積病楊玄操云多吐多瀉多困多熱是也

面手脚腫是虛中積

腹脹不思飲食是胃積

合面喫土炭痢痛大腹宜作腸積

面多黑困眼不開脾藏積

小便似油脚手腫腎藏積

渴瀉不止膀胱積

腹内虚鳴小便赤黃小腸積

多吐逆不喫食上膈中有積

患眼渾身虚腫脾積久取不下曰虚中積肚腫四肢黃者受水氣也小便如米泔肝藏積頭髮黃者疳勞候欲發此背宜作胃積眼睛黃鼻出水肝肺有積乃風

痢候赤白滯痢藏府內久積腸內虛鳴此氣虫候合
地卧是痢虫攢心多吐逆或日近及氣酸臭悉可取
若久勿遽取恐作慢脾宜調理

保生論積病脉沉實因恣餐毒食瓜桃李果肌滑黏
膩物蘊成積聚證見前

脉洪大下黑血形瘦不行坐久患積腹急如鼓項軟
四肢冷口噤都不食並死候

茅先生兒初受諸積歌

小兒諸積病還因乳哺成先從腹肚脹次及面

虛盈多嚥面合地小便似油清髮黃兼滑瀉吐
逆肚虛鳴白痢更并赤眼黃因得名

積病不治歌

候得小兒諸積病百個難醫一個命胃積多生
手掌瘡疳勞吐瀉因難整孩兒生下五色惡瘦
弱伶仃無差日久瀉止來又忽瀉口中熱氣奔
奔突手脚心痛朝暮熱面黑惡瘦樂難衝頰紅
極熱并驚久此是六積命還窮

千金治身熱頭痛食不消腹脹滿或小腹絞痛大小

便不利兒無異疾唯乳哺不節或驚悸寒熱服此不差更服凡食少氣息不快夜啼不眠是腹內不調悉宜紫雙丸（億詳例云服紫丸不下服赤丸赤丸差駛病重者宜比用朱砂又力緊于紫丸疑即是此）

麥門冬（十銖） 甘草（炙五銖） 甘遂 朱砂（各二銖）

蠟（八銖） 巴豆霜 蕤仁（各十八銖） 牡蠣（煅赤八錢）

散更合擣二千杵藥燥入蜜半歲兒服如荏子一二歲如半麻子七八歲如小豆各二丸兒大量加雞鳴時服至日出不下投熱粥飲數合丸皆雙出

下甚冷粥止

外臺扁鵲云療久癖積聚留飲宿食天行傷寒欬逆消歇久病羸瘦老小服之或吐下汗曾青丸

曾青　朴硝各二分　茯苓　寒水石

大黃　附子炮各三分　巴豆熬二分

異擣篩竟巴豆硝石合擣六千杵次附子次茯苓次大黃次曾青次寒水石次蜜每入一藥擣千杵大人服如大豆二丸五歲下如麻子一丸漸加薄粉粥清下复令汗吐下氣發二丸霍亂三丸泄痢

一二九一曾青三分忌猪肉冷水蘆笋大酢

醫局療風氣結聚宿食兼砂石皮毛在腹中及積年腰痛冷如氷石脚氣衝心煩憒悶亂頭旋暗倒肩背重悶心腹脹滿胷膈閉塞風毒氣連頭面大小便秘脾胃氣痞不食脚轉筋掣痛攣急心神恍惚眠寢不安七寶丸

大黃煨十五兩　桃仁熬六兩　枳實熬　木香

柴胡　訶梨皮各五兩　甘草熬四兩

末蜜丸如桐子食後米飲下廿丸或臨卧增利為

度量虛實與覺病退服五補丸

茅先生青金丹治諸積

滑石　白丁香　天南星各二錢　青黛平錢滿挑

二錢　輕粉重二錢　水銀二錢錫二錢溶吟用

川巴豆七十二片不損者浸一宿懸當風乾

末軟飯丸桐子大傷寒後取積淡葱湯下取疳虫

牛肉炙汁驚風肚中緊硬面青黑金銀薄荷葱湯

肚中傷及肚皮熱肚脹夜熱似疳面青黃色服微

黃腹中有積皂角子二七粒灰內煨水一盞煎半

盞下積瀉魚酢湯下氣積炒茴香湯下周歲十四
丸三歲十八九七歲廿四九量加四更時服天明
積盡依證藥補臨喫先吐下毋涎不妨

萬靈丸治諸積

木香　黃連　蓬莪茂各半分　陳皮
青橘去瓤各一分　檳榔一個重一錢半
末一錢淨巴豆一粒醋煮紫色杏仁肉一個燈火
上煆留性研醋糊丸菉豆大薄荷薑湯吞五七至
十丸

嬰孺治下後寒熱血積成癖左脇下或寒飲或冷食積聚氣動胷心留熱不下食飲闇瘦宜先散氣下食後服檗雙丸見前去宿積自无悦也

柴胡　茯苓　人參　白术

鼈甲醋炙各二分

切如豆水二升煮五合空心分温三四服相去如人行一二里久再服粥將息

錢乙消積丸

丁香九個　縮砂仁十二個　烏梅肉焙三個　巴豆霜二個

細末糊丸黍大三歲上三五下二三丸不時湯下
張氏有大半夏無砂仁朱砂衣滴水丸名五聖丹

紫雙霜丸消積聚
巴豆霜　杏仁各三七粒　代赭石飛一錢
細末飯丸如粟服三五至十丸皁角仁湯下無時量與

張渙萬靈丹治脾胃久不和挾積及乳癖溫熱藥皆不效者
肉桂　川黄連　蓬莪茂各一兩　肉豆蔻

檳榔 陳皮去白 木香 丁香各半兩

巴豆 杏仁麩炒並燈上燒各二七個

擣勻滴水丸黍大未周晬一粒十歲上七粒冷薑湯下

劉氏桃紅散治驚積癖積常服進食

馬牙硝 朱砂 茯苓 人參

等分末一歲一字新汲水入蜜調下

檳榔散治食積癖積肚脹

甘草炮 木香麵煨各一分 檳榔二個 青皮半兩同巴

豆肉卅粒炒半時去豆　陳米半合製同上

末半錢或一字葱湯調服漕利差

莊氏治驚癖積聚軟金丸

青黛　膩粉　胡黃連　麝各一分

寒食麵三錢　史君子三個　天漿子三七個

研滴水丸桐子大金銀薄荷湯化

兒久困驚積滯食急惕驚風卒乳不下躁熱吐瀉多

叫不聰磨刀丸

全蝎七個　朱砂一錢　粉霜二錢　半夏七個洗淨

末巴豆十四個細研蜜浸蒸餅心麝少許丸如菉豆磨刀水下一歲一丸量加減吐瀉不妨即用驚藥調理不得喫和氣散恐動驚氣

吉氏蘆薈丸治驚疳積滯或渴或瀉或熱

蘆薈一錢　史君子帶殼　燕荑仁半錢　檳榔一個

胡黃連　沉香　木香各一錢　麝少許

龍膽草　朱砂各半錢　夜明砂去土二錢

乾末醋膽丸如黍米飲下十粒常服妙

鎮心真珠丸治久積驚疳退積滯化風涎利胸膈

真珠　巴豆霜　滑石各一分　半夏薑汁浸三分

續隨子三分　白附子半兩　寒食麪二分　天南星半兩薑汁浸七次

末滴水丸菉豆大二歲一二丸加減葱白湯下痏積史君子湯下

追寬散治果積

白丁香　輕粉　官桂去皮各三錢

末水調半錢臨時服來日下所傷物異功散胃氣不和門煎紫蘇木瓜湯調三服和氣

桃符丸取驚積

朱砂　天麻　鉛白霜各半錢　輕粉二錢

水銀皂子大　巴豆淨三粒

末飛羅麪滴水丸如菉豆壯熱吐瀉脉沉緩眼困

是驚積周歲下五丸桃符湯下加減服

睡驚散鎮驚取積

鬱金半兩巴豆十四粒同炒　辰砂半錢　麝

乳香各一字　陳皮去白一分

末一字薄荷湯下更量

勝金餅子治虛中積

粉霜　延胡索　巴豆霜各半錢　輕粉一錢

朱砂皁子大　石鷰一個

冷水為餅如桐子皁子湯服一丸量加減

治諸般氣積或驚結不通木香散

木香半錢　陳皮二錢　巴豆淨五粒

陳皮巴豆炒黃取巴豆五片與木香末研服半錢

或一字陳米飲下若吐瀉尾鑵煎香附湯下量加

減

癥瘕第二

巢氏兒五藏不和三焦不調寒冷氣客之令乳哺不消結聚成癥癖其狀按之不動有形段者癥也推之浮沉者瘕也弦急牢強左右不定癖也皆由冷氣痰水食飲結聚而成

聖惠兒寒温失調飲食不化與藏氣相搏結聚不動為癥食結在腹喜寒洒洒如瘧不能飲食常隱隱而痛食癥也

寶鑑瘕者在腹疼痛定在一處癥則不痛

楊大鄰兒不慎啜味嘗吃黏滑膩肥腥麵瓜果胃口不和結實難化成癥痞胷膈閣攻衝滎衛則嘔逆喘粗眼澀更加頻渴或歸下部則泄瀉頻併兩脅虛脹只和脾胃或更踈瀉則飲食不化漸次成癥大約諸證皆宜早療不尋根源久則羸

聖惠鱉甲散治癥瘕壯熱頭痛嘔逆腹痛寒熱頭髮作穗及食癖乳癖

鱉甲醋炙一兩　枳殼麩炒　木香　川大黃炒

京三稜煨　檳榔各半兩　人參　赤茯苓

柴胡各三分　桂心一分

羅散一錢水小盞煎五分温服日三量加減

鼈甲丸治癥瘕羸弱不乳

鼈甲醋炙　京三稜煨　川大黄炒　檳榔

郁李仁炒各半兩　木香　青皮去白　肉桂去皮皺

柴胡　人參　桔梗　防葵各一分

羅末蜜丸如菉豆五六歲早晚粥飲下七丸更加

減

牛黄丸治癥瘕百病痞癖腹脹黄瘦發渴不常客忤

痢及吐逆不定心腹多痛及驚風天瘹

牛黃　犀角　木香　當歸炒各半兩

人參　川大黃炒　光明砂飛　檳榔各三分

麝　鼈甲醋炙一兩　巴豆淡漿水一大椀煮盡出油各一分

代赭二分　肉豆蔻二枚　杏仁麩炒廿枚

羅末蜜丸如菉豆百日內乳汁下一丸二三歲粥飲下二丸病在胷膈吐出病在藏府即下喫漿水粥一日利止五日十日進一服永無滯結更量加減

治食癥或寒熱四肢黃瘦不食礞石丸

礞石　乾薑炮　杏仁麩炒各一分　巴豆霜

硇砂各半兩

研細米醋一茶椀煎如膏

京三稜煨　皁莢酥炙去子　蓬莪茂各一分

羅入膏丸如菉豆三歲一丸茶清下稍大意加張渙

三稜煎同治脾虛夾積

治積年厭食并治血氣及癥塊硇砂丸

硇砂半兩　青礞石　穿山甲炙　京三稜煨

磁石（燒醋淬七次） 乾漆（炒烟出） 赤石脂（各一分） 蝱虫（淨炒）
水蛭（炒各五十枚） 巴豆霜（十五枚） 京三稜（煨一分）
羅末入巴豆研勻軟飯丸如小豆服三丸兒一丸
燒蒸餅灰湯下五服差
博濟消癥瘕積聚血結刺痛木香硇砂煎丸
木香 大黄（煨） 京三稜（生） 巴豆
官桂 筒子漆（炒） 青皮 蓬莪茂（炮）
附子（炮） 乾薑（炮各一分） 香墨（指節大） 硇砂（半两醋一盞浸一宿去石）

末大黄三稜巴豆銀石器内好醋一升煎一两沸次入硇砂熬膏次入諸藥杵千百下丸如菉豆服五丸冷食水酒結聚腹内氣塊痛乾薑湯或橘皮湯吞下食停寒白湯黏食不消成氣塊麪湯牛羊魚鼈肉成氣塊不散用所傷汁下宿酒不消酒下血氣當歸酒妊娠不服要轉淡茶下加至七丸兒三丸常服一二丸

張渙大腹子湯治癥癖腹滿小便不利

大腹皮一两　檳榔　枳殼麩炒　赤芍藥

人参　知母　陳皮去白各半两　甘遂煨一分

羅末一錢水小盞煎五分温量服

聖效丹治癖結諸病久不差

當歸　木香　好朱砂飛　桂心各一两

甘遂煨　京三稜炮乘熱剉　鼈甲酥炙各半两　麝

狌仁各一分　巴豆三七個絹袋盛酒煑一宿

研細黄蠟六两慢火鎔同諸藥攪成膏丸如黍周

晬一粒十歲七粒温米飲下食後

癖氣第三

聖惠絕乳兒五藏調和榮衛氣理則津液通流雖多飲水漿不能為病若調養乖方三焦痞隔則腸胃不能宣行因飲水漿便停滯不散更遇寒氣相搏結聚成癖癖者僻也在兩脅間有時作痛

茅先生兒七歲內右脅下痛者為癖氣蓬莪茂散（痃氣門）夾建脾散（胃氣不和門）如面黑眼視瀉黑血鼻口手足冷不進食死

錢乙兒病癖乍涼乍熱飲水或喘嗽與潮熱相類不早治必成疳以有癖令不食致脾胃虛而發熱故飲

水過多即蕩滌腸胃亡失津液胃不能化水穀脉沉細益不食脾胃虛四肢不舉諸邪遂生鮮不瘦而成

癖

曹宣德子三歲面黃寒熱不食飲水及乳不止衆謂潮熱用牛黃麝香丸不愈及乾葛散止渴反吐錢曰癖也當白餅子下（搐搦門）後補脾磨以消積丸（積聚門）果愈善飲水者食伏管內不能消致令發寒脈止渴藥吐者藥衝脾也

寶鑑兒失乳或毋暴以食哺入脾不消結聚成塊為

食癖

滯寒不流又夾痰涎成癖自然成聲

千金治癖實壯熱食不化中惡忤氣牛黃鼈甲丸

牛黃　厚朴薑製　茯苓　桂心

芍藥　乾薑炮各半两　鼈甲醋炙　麥麪

柴胡　大黃　枳實麩炒　芎藭各一两

末蜜丸如小豆日三意量

外臺治老小腹中癖氣

牛膝　枳實炙　鼈甲炙　茯苓各八分

桔梗　芍藥　白朮　人參

厚朴　大黃　桂心　檳榔各六分

擣篩蜜丸如梧子空心溫酒服廿丸至三十丸日二忌生冷油膩小豆黏食莧菜桃李雀肉大醋生葱猪肉

治兒悶癖

青葙苗六月六採　知母　黃連　大黃

梔子仁　苦蔞　常山　萎蕤各八銖

苦參皮十二分　甘草炙　蜀漆洗各五分

篩蜜丸如梧子飲服五丸至十五丸日再知為度

兒減忌猪肉熱麵葱蒜生菜菘菜海藻

療兒冷癖痃癖氣不下食瘦時時脇下痛

防葵　當歸　枳實炙　厚朴炙

楮實　人參　黃耆　茯神

訶梨勒皮　白朮各八分　牛膝　郁李仁

柴胡　大麻仁　芍藥　橘皮

防風　紫菀　薏苡仁各六分　鼈甲炙

三稜根各廿分　桂心七分　大附子二枚炮　乾薑二分

甘草炙 乾地黃 大黃各十分 五味子四分

檳榔四個 仙鼠二枚無糞二合代

擣篩蜜丸如梧子量飲服

秘錄治氣癖

三稜汁作羹粥以米麪為之與乳母食兒每日服

一棗大作粥十歲內及新生無問癇熱無辜痃癖

皆理

治悶癖頭髮堅黃瘰癧羸瘦

林檎杵末和醋傅癖移處便傅

陳藏器

苦瓠末傅破者煮熟解開熨

聖惠治癖不散肌肉瘦瘁或心煩不食即吐逆或大小便秘及天釣驚風大紫霜丸

代赭一　朱砂飛　杏仁麸炒　犀角各半兩

麝　牛黄　巴豆霜各一分　當歸

川大黄炒　鼈甲醋炙各三分

羅末蜜和擣二三百杵丸如麻子粥飲下二丸驚風天釣荊芥薄荷湯下更量服下惡物效

前胡丸治癖氣腹痛

前胡　桔梗　赤芍藥　赤茯苓

枳殼麸炒　川大黄炒　郁李仁炒　當歸炒各半兩

鼈甲醋炙一兩

末蜜丸如菉豆三歲空心粥飲化五丸更量

治癖氣手脚心熱面黄不食漸羸鼈甲丸

鼈甲醋炙　川大黄炒各一兩　柴胡三分　人參

赤茯苓　當歸炒各一分　桂心　白术

木香各一分　京三稜煨　檳榔　薑切片焙各半兩

羅末蜜丸如菉豆三歲空心研五丸粥飲下量與
下惡物效

京三稜丸治癖氣手脚心熱脾胃虛弱不食面黃漸
瘦

京三稜煨 防葵 木香 枳殼麩炒
人參 赤茯苓 白朮 桂心各半两
郁李仁炒三分 川大黃炒 鼈甲醋炙各一两

末蜜丸如小荳粥飲下隨年丸數日三兒稍大酒
下

雞骨丸治癖氣羸瘦脇堅滿時痛食不成肌

烏雞骨一具酒浸炙黃　川大黃炒　鼈甲醋炙

黃芩　澤瀉　柴胡　桔梗

人參　赤芍藥各一兩　枳實麩炒半兩　杏仁麩炒

防葵各三分　䗪虫炒五枚

末蜜丸如菉豆四五歲兒粥飲下七九日二量加

治癖氣堅硬瘦瘁不食芫花丸

芫花醋炒　鼈甲醋炙　川大黃炒　桃仁麩炒各半兩

京三稜煨　雄黃各一分

羅蜜丸如栗三歲兒空心薑湯下三丸量加

嬰孺知母丸治大小胷心癥癖頭痛微眩面黃便赤寒熱手足厥冷不食夏秋轉甚淋瀝或手足煩躁或連瘧不止或瘥後朝差夕增乍寒乍熱或溫疫或瘧作頭項苦強或胷膈間痰熱癖飲及傷寒七八日結熱痰積不除久後寒熱頭痛逆害食飲胃中煩躁夜臥苦煩朝差夕甚有如溫瘧此除熱消飲治寒熱和胃氣利小便胷膈痰熱留飲面黃兒壯熱諸癖癥不令吐下

知母 大黃各三兩 黃芩 杏仁炒

常山各二分 蜀漆 甘草各一兩 麻黃二兩去節

牡蠣六分煅

末蜜丸桐子大飲下五丸至廿丸日三老少半之

雞骨鼈甲丸治羸瘦腹有癖脅堅滿時痛食不生肌

宿烏雞骨一具酒浸一宿炙 鼈甲炙 蜀漆

柴胡 桔梗 人參各四分 芍藥

大黃 黃芩 杏仁各五分 枳實半分炒

防葵 白朮各三分 䗪虫五個炙

末蜜丸如豆四五歲二丸日再

治水癖黑丸子

當歸四分　細辛　附子炮　乾薑

胡椒汗各三分　盐豉二合　巴豆淨炒十個　狼毒炙一分

杏仁去皮炒十枚

末蜜丸如菉豆飲下三丸

丁時發七八歲兒多驚或壯熱日羸瘦身雖不痛有時痢膿嘔逆不食是癖氣狀似瘧

柴胡　黃芩各一分　枳殼炒二片　甘草炙

知母　芍藥各二介　大訶梨勒皮一個㚻小二個

末水一盞煎服

王氏二丁散治諸癖不消腹痛乍寒乍熱泄瀉無時

多渴黄瘦或下痢腹脅有塊如掌癖側石硬

楝丁香　白丁香　没石子各二錢　硫黄

密陀僧各三錢

細末一字或半錢白湯調空心臨卧日二消為度

千金灸兩乳下一寸各三壯

乳癖第四是妳脾

聖惠乳母食飲無常醉飽過度即乳兒不知節令兒脾胃虛嫩不能消化或偏臥乳兒不能迴轉兒亦飜乳滯偏脅下因兹結聚成塊而痛面色青黃發歇壯熱吐乳多飜口内生瘡漸漸黃瘦腹内結塊名乳癖

茅先生兒遍身黃腫小便赤黃體微蒸熱此因胎熱又哭後吃乳不消遂為奶積牛黃膏臟熱門天竺黃散實熱門調中飲胃氣不和門與服黃入眼目視氣喘魚口握拳不治

寶鑑乳擁結不消又夾頑涎成痞在腹或動不動有時腹痛

玉訣歌

妳脾痞結積因傷腹脹筋青面色黃熱發有時

或渴飲痞傷脾熱口生瘡

先解利後取積次調胃一云惺惺丸取次銀白散調氣

聖惠京三稜散治乳癖結實或滯惡不散漸羸面黃春夏多發不欲乳

京三稜煨微 川大黄炒 檳榔 鼈甲醋炙

赤茯苓各半兩 枳殼麩炒一分

羅一錢水小盞煎五分分二服日三四下惡物

人參丸治乳癖手脚心熱面青黄不乳漸羸

人參 薑炒 桂心 赤茯苓

白朮 枳殼麩炒 木香 當歸炒

檳榔 京三稜煨 鼈甲醋炙 大黄炒各半兩

羅蜜丸如菉豆一歲兒粥飲下三丸日三量加

化癖丸治乳癖結塊久不消化

巴豆霜半两　膩粉　朱砂各一錢　黃鷹糞一分

硇砂　雄雀糞各一字

研糯米飲丸如黍一歲一丸空心皁莢仁湯下下

惡物

治乳癖不消心腹脹滿木香丸

木香　京三稜煨　檳榔　人參

青皮去白　赤茯苓各一分　牽牛子炒　艸豆蔻去皮

各半两　郁李仁炒一两

羅醋麵糊丸如梧子粥飲下三丸量加

譚氏治乳癖

訶子五個磨兩尖　蜜陀僧三錢　硫黃　輕粉

白丁香　黑丁香　粉霜　鵶砂一錢

末半錢男患女乳調女患反足

玉訣銀白散生胃氣下後宜此

人參　茯苓　甘草炙　白朮炒

白褊豆去皮　藿香

等分末一錢紫蘇湯調

張氏

芫花一两醋浸三日淨洗大黄末半两蒜一斤研男左女右塗乳母手心熨擦癖上患人口聞藥氣即時取了立效

董氏

紫河車二两　寒食麪三两

細末一匙許水調塗足心病左塗左病右塗右紅帛上縛大便下盡洗去一用人參醋調

孔氏

蜜陀僧研細大蒜汁調大小恰好塗口有蒜氣手

揉覺癖消五六分温漿水洗去遲恐藥毒損氣藥
乾温水潤王氏用白芥芸薹水調塗醋麪餅蓋
莊氏粗線兩條量兩乳頭中間闊狹于兩乳頭垂下
照令端直方停對兩乳于左右肋各灸七壯炷如麥

痃氣第五

聖惠飲食不調生冷過度與藏氣相搏結聚而成脇
脅兩傍上下有物弦直大如臂小如指弦起急痛名
痃氣
茅先生塊在左脅下痛名痃氣蓬莪散夾建脾散胃氣

不和門 如面黑眼視瀉黑血鼻口手脚冷不進食死

聖惠京三稜散治痃氣急痛

京三稜煨 枳殼麩炒 大腹子 鼈甲醋炙

神麯炒 訶梨勒皮 蓬莪茂 麥蘖炒

厚朴薑製 青橘皮去白各一分 黑三稜半兩

羅粥飲調半錢日三更量服

大黃散治痃氣發即縈痛不食

川大黃炒 鼈甲醋炙各一兩 麝 木香各一分

京三稜煨 檳榔 甘草炙各半兩

羅粥飲調半錢日三四意加減

防葵丸治痃氣不食肌瘦

防葵　當歸　桂心　訶梨勒皮

陳皮去白　川大黃炒　鼈甲醋炙　桔梗各半兩

杏仁淨麩炒廿枚　附淨炮裂　吳茱萸浸七次炒各一分

羅蜜丸如麻子粥飲下五丸晚再量兒

治痃氣食不消化四肢瘦弱

鼈甲醋炙　川大黃炒　京三稜煨各半兩　枳殼麩炒

芎藭　桔梗　赤茯苓　赤芍藥

乾薑炮　桂心各一兩

羅蜜丸如麻子粥飲下五丸日三更量

痞結第六

巢氏痞者塞也兒胸膈熱實腹有留飲令榮衛痞塞腑臟氣不宣通結聚脹滿或壯熱為痞結

千金鼈甲丸治結堅脅下有痞手足煩熱

鼈甲醋炙　芍藥　大黃各卅銖　茯苓

柴胡　乾薑炮各卅四銖　桂心六銖　䗪虫

蠐螬各卅枚

末蜜和如桐子服七丸漸加知為度

陳藏器治痞滿

三白草絞汁服令人吐逆除胷膈熱亦主痺兒痞滿按此草初不白入夏葉端半白如粉農人候之蒔田三葉卅白便秀

聖惠前胡散治痞結壯熱羸瘦多啼

前胡　川大黄炒各三分　枳殼麩炒黄　犀角

郁李仁炒　鼈甲醋炙各一兩

羅散一錢水一盞煎五分量兒減溫服利為度

大腹皮散治痞結壯熱增寒大小便不利

大腹皮　陳皮(去白)　桔梗　鼈甲(醋炙各三分)　人參　赤芍藥　川大黃(炒)　木通(各半兩)　甘草(炙一分)

羅散一錢水小盞煎五分量加減溫服

檳榔散治痞結壯熱不乳心胸煩躁

檳榔　川大黃(炒各半兩)　枳殼(麩炒)　人參　柴胡　知母　赤芍藥　地骨皮　甘草(炙各一分)

羅散一錢水小盞煎五分溫量服

治腹内痞結多驚牛黄丸

牛黄　麝　川楝炒汗　甘遂煨各一分

巴豆霜半分　蜈蚣淨炙一枚　蚱蟬炙七枚　川芒硝

真珠　雄黄各半两

羅蜜一合白蠟一两煎鎔丸如麻子粥飲下二丸

意加減利為度

嬰孺治八痞曾青丸一當心下堅痛形如小杯名慈

痞主曾青二如板起脇下槍心名蚘痞主龍骨三夾

臍如手名臭痞主龜甲四繞臍腹雷鳴名寒痞主乾薑五當心如杯不可動搖名虫痞主牡丹六心下如盤名氣痞主鼈甲七生于寒熱腰背痛壯如瘧名血痞主䗪虫八膿出腹痛名風痞主蜚蠊

曾青　乾薑　䗪虫　紫石英

牡丹　桂心各二分　大黄　龍骨各五分

蜀漆七分　龜甲又云鼈甲　真珠　蜚蠊各三分

細辛六分　附子炮四分

末視何痞主藥倍之蜜和末食服桐子大五六歲

上下四丸兒小意減日三丸服之當微煩腹中諸
病皆出忌猪魚菜擾上說疑別有鼈甲並用
治先寒熱腹堅牢强痞不食食不生肌時壯熱雞骨
丸
芎　當歸　大黃（蒸三升米下）　紫菀
茯苓（各三分）　杏仁（炒）　桂心（各四分）　杜衡
白芷　石膏（各二分）　半夏（洗一分）　黃雌雞（一個）
（破腹勿中水取兩脊翼及脛骨炙）
末蜜丸如小豆日三稍加

宿食不消第七

巢氏胃為水穀之海脾氣磨而消之胃氣和調則乳哺消化若過冷冷積脾胃宿食不消診其脉三部沉者是

錢乙用益黃散（胃氣不和門）

外臺九味當歸湯療宿食不消發熱

當歸　甘草（炙）　芍藥　人參

桂心　黃芩　乾薑（各一分）　大棗（五枚）

大黃（二分）

切水升半煎六合分服

聖惠治宿食不化少欲飲食四肢消瘦腹脅多脹訶梨勒散

訶梨勒皮三分　人參　白术　麥蘖炒

陳皮去白焙　檳榔各半兩　甘草炙一分

羅散一錢水小盞煎五分去滓日四五溫服

陳橘皮散治宿食不消心腹脹滿

陳橘皮焙　高良薑　人參　檳榔各一分

白茯苓　甘草炙各半兩

羅散一錢水小盞薑少許棗一枚煎五分不時量

溫服

治宿食不化發熱有時檳榔丸

檳榔　牽牛子微炒　大黃炒各半兩　乾薑炮裂

枳殼去瓤麩炒黃　甘草炙各半兩

末蜜丸菉豆大空心湯下五丸晚再臨時加減

丁香丸治宿食不消心腹虛脹

丁香　木香　乳香　雄黃

青橘皮去白焙各一分　肉豆蔲　檳榔各二枚

巴豆霜（半分）　硫黃（一錢）　朱砂（飛，半錢）

羅末蜜丸如黍，粥飲下三丸，量與。

治宿食不消肉豆蔻散

肉豆蔻（一枚）　川大黃（一分，炒）

粗羅一錢，水小盞煎五分，日三服，意加減。

嬰孺牛黃鼈甲丸治癖實壯熱，食不消化，中惡忤氣。

鼈甲　麥麯（炒）　麥門冬　柴胡

大黃　乾薑　芎（各一兩）　牛黃（二分）

厚朴（炙）　茯苓　桂心（各半兩）　芍藥（五分）

末蜜丸如大豆服二丸日三

劉氏治心腹脹滿痞氣傷食臆肚瀉痢不轉

青州棗一個內巴豆一粒慢火炙黑細研入麝少

許飯丸如麻子一歲一丸傷食熱米飲瀉冷湯忌

生冷油膩熱物

張氏治飲食不化寬中止吐麝香安中丸

甘松葉二兩　益智　丁香皮　香附各三兩

茂一兩　南木香半兩　麝一錢

細末麪糊丸更用生蜜煎油和丸如黍服二三十

丸薑湯下不時

安神道氣消酒食益脾胃老小皆宜

青皮一斤浸三日日三換味出去瓤切　上白鹽花再淋煎要雪白五兩

甘草六兩炙　新舶上茴香四兩

甜水一斗鍋熬不住攪勿着底置瓷罷水盡慢火炒勿焦收青皮傷生冷果菜類嚼數片常服一兩片尤宜老人

莊氏治驚熱化積滞妳食墜涎利大腸真珠丸

真珠飛　天竺黄　朱砂飛各一分　雄黄飛

丁頭代赭 麝各半兩 杏仁麸炒卅粒 巴豆淨十粒油

煎褐色同杏仁研

末蜜丸如菉豆薑湯下一丸三歲上加

金箔丸治兒驚風妳食不化或外風傷冷毒瀉血一切疾

金箔卅九片 朱砂飛 水銀 牛黃

青黛 白殭蚕炒 蟬殼 麻黃去節

白附子 天麻酒炙 麝 犀角

乾蝎 天南星炮各一分 膩粉一錢

乳鉢研生蜜和油單紙裹服二丸桐子大薄荷汁
化傷寒薑薄荷湯化兒諸疾效

胡黃連丸治驚病化涎消食

胡黃連　牛黃　朱砂　麝少許
蘆會　青黛　鈎藤炙　骨仲
膩粉少許　鶴虱　雷丸　天竺黃

等分羅末麪糊丸如粟服三丸取下驚食如無不
動

王氏安脾胃消積滯止吐利除心腹脹滿利胷膈散

滿痞常服消水穀進食丸

丁香一錢　肉豆蔻二個　木香半錢　巴豆生九個

五靈脂七錢

細末糊丸如菉豆一歲一二丸食後薑湯下日二

傷飽第八 食不知飽附

巢氏兒食多過飽飽則傷脾脾傷不能磨食兒四肢重身熱面黃腹大又兒嗜食仍不知飽不生肌肉腹亦大大便數而多泄腸胃不守故

聖惠檳榔散治傷飽太過脾氣消瘦面色赤黃手足

俱熱腹心脹悶

檳榔　枳殼（麩炒）　人參　川大黃（各炒）
（半兩）　赤茯苓　神麴（炒）　陳橘皮（焙）
甘草（炙）　麥蘖（炒各一分）
羅散一錢水小盞薑少許葱白二寸煎五分溫服
日三四量與

前胡散治傷飽心腹滯悶不能乳哺

前胡　檳榔　川大黃（炒）　枳殼（麩炒）
赤茯苓　沉香（各半兩）　訶梨勒皮（三分）　木香

甘草一分炙各

羅散一錢水小盞薑少許煎五分溫服日三四憲加減

丁奚疳丸

巢氏兒哺食過度脾胃尚弱不能磨消則水穀之精減損無以榮氣血致肌肉消瘠其候腹大頸小黃瘦為丁奚若久不差變成穀癥傷飽名哺露三種相似輕重異名

真珠囊吐瀉久不差或病退不能行膝大腸細𨂂丁

奚七歲下𤶿跛槌風十五下名寉膝風𦵝風伶傷腎腎主骨故

莊氏疳肚丁奚𩒐腹大青筋見曰疳肚無青筋曰丁奚過飽傷食得之

附後疳氣大腹瘦弱𢭏𤸷根猪脂煎服

又炙鼠肉若伏翼肉哺之本草亦治哺露

聖惠雞骨丸治丁奚骨中微熱腹內不調食不為肌或寒熱腹大

雄雞骨一具炙　赤芍藥半兩　赤茯苓半兩　鼈甲一兩塗醋

石膏飛　川大黃炒　紫菀各半兩嬰孺五分

陳橘皮去白半兩嬰孺三分　白礬燒　細辛

附子炮淨各半兩　黃芩　甜葶藶炒三分　桂心三分嬰孺二分

羅末蜜丸如麻子粥飲下五丸日三

麝香丸治丁奚肚大青脉起不生肉四肢乾瘦頭大髮黃

麝　肉豆蔲　乾蟾醋炙　夜明砂

地龍並炒一分　朱砂飛　五靈脂各半兩　白礬一分

蜣蜋（炙淨三枚）

羅末蜜丸如菉豆空心溫水下五丸晚再服

治丁奚腹脹乾瘦毛髮焦黃二聖丸

大蝦蟆（一枚端午收眼赤者佳）　臭黃（二兩）

淨蝦蟇肚腸內臭黃末紙裹泥封乾更泥三遍火燒煙盡羅末粟米飲丸如粟一歲一丸粥飲下服後生熟水浴拭乾青衣覆令蟲出效

嬰孺芍藥丸治食不消丁奚腹大不生肌

芍藥　大黃（各五兩）　桂心（二兩）　茯苓

柴胡各四兩

末蜜和杵一歲大豆許二丸不知加食後服

八痞丸治堅痞面黃羸瘦丁奚不食食不生肌心慒煩悶時發寒熱五藏虛脹腹中疠痛常苦下痢

蜀漆七分　細辛六分　龍膽五分　乾薑二分

附子四分炮　牡丹皮　䖟虫宜䗪虫　蝟頭酒炙

曾青熬空青代　桂心各三分

末蜜丸桐子大飲下二丸日三知為度忌猪肉魚生菜等物

莊氏治疳氣腹大氣急不食塌氣丸

青橘皮巴豆各一個麻線繫暑熱燚中炒去巴豆

羅末麪糊丸如菉豆三歲上五七丸不時米飲下

哺露第十

巢氏哺乳不調傷于脾胃脾胃衰弱不能飲食血氣

減損不榮肌肉如羸露藏府之氣不宣則吸吸

苦熱爲哺露

寶鑑哺露歌

小兒哺露病尫羸飢飽多傷損在脾藏府不通

身有熱如柴骨立漸枯衰

聖惠雞骨丸治哺露傷飽手足煩熱羸瘦

黃雌雞骨（熟左右肋一兩炙）　赤茯苓　赤芍藥

川大黃（炒）　紫菀　柴胡（各半兩）　細辛

黃芩　桂心（各一分）

羅末蜜丸如菉豆溫水下五丸早晚各一服量加

治哺露腹堅體熱羸瘦鼈甲丸

鼈甲（醋炙）　肉蓯蓉（酒浸一宿去皮炙各三分）　常山（半兩）

羅蜜丸如麻子粥飲下五丸日三或下青白黑物

人參丸治哺露失衣當風濕冷水浴若腹大時痢或寒熱如瘧不食食不生肌或不消化四肢羸瘦

人參　麥門冬焙　半夏洗去滑　黄耆

川大黄炒　白茯苓　柴胡　黄芩各三分

訶梨勒皮煨　甘草炙　鼈甲醋炙各半兩　芎一兩

羅末蜜丸如麻子一二歲粥飲下三丸日三量兒

寶鑑灸大椎穴又尺澤脘內橫文中央又九角

幼幼新書卷第二十二　迫然齋刻